

**Instrukcja używania
Instructions for use**

**KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY
MODEL FLORIDA (NT-BAC PLUS)**

ORTHOPEDIC COLLAR

Numer katalogowy / Catalogue Number:	DRQA0C
Basic UDI-DI:	59017804DRQA0CKS



Producent / Manufacturer:

Mdh sp. Z o.o.,
Ul. W. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź
Tel. +48 426 748 384
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Wydanie 11.05.2021
Edition 11.05.2021

Qmed®

CE

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Kołnierz ortopedyczny model Florida (NT-BAC Plus)

ZASTOSOWANIE:

schorzenia obszaru szyi nie wymagające bezwzględnego, pełnego unieruchomienia, uszkodzenia mięśni, więzadł, przeciążenia i stany zapalne układu mięśniowo-szkieletowego, dysfunkcje stawów międzykręgowych z lub bez urazu, uszkodzenie krążka międzykręgowego, artrozy, choroby reumatoidalne, doleganie złamań.

PRZECIWWSKAZANIA:

Silniejsze zespoły bólowe przy zmianach zniekształcających kręgosłup i dyskopatiach, stany pooperacyjne, złamania i zwichnięcia kręgów szyjnych.

OPIS PRODUKTU:

Lekki, jednczęściowy, profilowany anatomicznie, wykonany z pianki poliuretanowej o odpowiednio dobranej gęstości. Zapięcie i regulacja obwodu przy pomocy rzepa. Obszycie kołnierza posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybicze. Dzięki poliamidowemu wzmacnieniu większa siła stabilizacji.

SPOSÓB UŻYTKOWANIA:

Właściwe użycie kołnierza jest tak samo ważne jak właściwy dobór rozmiaru ze względu na prawidłowe unieruchomienie i komfort użytkowania. Za pomocą rzepów należy umiarkowanie dociągnąć i zapiąć kołnierz.

KONSERWACJA:

Kołnierz może być prany ręcznie w letniej wodzie z użyciem łagodnych detergentów. Nie prac w pralce, nie chlorować. Nie wyżymać, delikatnie wycisnąć. Suszyć w pozycji rozłożonej z dala od sztucznych źródeł ciepła.

UWAGA:

Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób.

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA.

OBWÓD SZYI (CM)

WYSOKOŚĆ KOŁNIERZA (CM)	OBWÓD SZYI (CM)					
	29,5 – 32,5	32,6 – 35,5	35,6 – 38,5	38,6 – 41,5	41,6 – 44,5	44,6 – 47,5
7,0	A1	A2	A3	A4	A5	A6
8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
10,00	C1	C2	C3	C4	C5	C6
12,00	D1	D2	D3	D4	D5	D6

INSTRUCTIONS FOR USE

Orthopedic collar model Florida (NT-BAC Plus)

INDICATIONS:

Dysfunctions of cervical area which do not require complete immobilization. Muscle and ligament injuries, strains and inflammation of muscular system, dysfunction of vertebral joints, injury of the intervertebral disc, osteoarthritis, rheumatic diseases, follow-up treatment of fractures.

CONTRAINDICATIONS:

Stronger pain syndromes with deforming changes in the spine, discopathy of the cervical spine, postoperative conditions, fractures and dislocations of the cervical vertebrae.

PRODUCT DESCRIPTION:

Light, one-piece, anatomically profiled construction made of polyurethane foam of carefully chosen density. Fastened and regulated with Velcro bands. The collar lining has anti-bacterial and anti-mycosis properties. The polyamide stiffening insert ensures better stabilization.

SELECTION AND FITTING:

Proper application of the collar is as important as proper sizing for immobilization and patient comfort. Use velcro tape to tighten moderately and button up collar.

MAINTENANCE:

Collar can be washed by hand in a very mild detergents at temperatures up to 35°C. Do not chlorinate, do not dry clean, do not wring, do not spin, squeeze gently before drying. Dry away from artificial sources of heat in spread form.

ATTENTION:

Not observing the rules of personal hygiene and cleaning the vest with inappropriate detergents may result in skin abrasion or other effects related to perspiration. Please, do not use gels or warming ointment. After washing, rinse the product carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis fabric.

THE FINAL DECISION CONCERNING APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A MEDICAL SPECIALIST.

NECK CIRCUMFERENCE (CM)

COLLAR HEIGHT (CM)	29,5 – 32,5	32,6 – 35,5	35,6 – 38,5	38,6 – 41,5	41,6 – 44,5	44,6 – 47,5
	7,0	A1	A2	A3	A4	A5
8,5	B1	B2	B3	B4	B5	B6
10,00	C1	C2	C3	C4	C5	C6
12,00	D1	D2	D3	D4	D5	D6